

泌尿器科がんレジメン

千葉メディカルセンター

No	対象	レジメン名 (投与量)	1サイクル (日)
1	前立腺がん	DTX (75)	21
2	前立腺がん	DTX (70)	21
3	前立腺がん	DTX (55)	21
4	尿路上皮がん	GC (1000/70)	28
5	尿路上皮がん	GEM+CBDCA (1000/5)	21
6	尿路上皮がん	キイトルーダ (200)	21
7	尿路上皮がん	キイトルーダ (400)	42
8	腎細胞がん	レンビマ+キイトルーダ (20/200)	21
9	腎細胞がん	レンビマ+キイトルーダ (20/400)	42

2024.7 作成

No.1

DTX

※前立腺がん

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)				
			1日目	8日目	22日目
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●				●
2	タキソテール注 75mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●				●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●				●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/m²に達すると浮腫の発現率が高くなる (DTXによる血管透過性亢進のため)

No.2

DTX70

※前立腺がん

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)				
			1日目	8日目	22日目
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●				●
2	タキソテール注 70mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●				●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●				●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/m²に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進のため）

No.3

DTX55

※前立腺がん

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)				
			1日目	8日目	22日目
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●				●
2	タキソテール注 55mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●				●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●				●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/m²に達すると浮腫の発現率が高くなる (DTXによる血管透過性亢進のため)

No.4

GC療法(GEM+CDDP)

※尿路上皮がん

1コース(28日間)

順序	治療内容	投与時間	1コース(28日間)												
			1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	8日目	...	15日目	...	29日目		
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●								●		●		●
2	ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL	30分	●								●		●		●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●								●		●		●
1'	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V アロカリス点滴静注235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分		●											
2'	硫酸マグネシウム補正液 4mL KCL注キット 10mL 生理食塩液 500mL	60分		●											
3'	フロセミド注20mg 1A 生理食塩液 50mL	5分		●											
4'	生理食塩液 50mL	FREE		●											
5'	シスプラチン注 25mg/m ² 生理食塩液 500mL	120分		●											
6'	硫酸マグネシウム補正液 4mL KCL注キット 10mL 生理食塩液 500mL	60分		●											
7'	ソリタ-T3号 500mL	60分		●											
8'	ソリューゲンF 500mL	60分		●											
内服	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後				●	●	●								

★シスプラチンの総投与量300mg~500mg/m²以上で聴力障害(高音域)が起きやすい。

No.5

GEM+CBDCA

※尿路上皮がん

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	4日目	8日目	22日目
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分						●		●
2	ゲムシタビン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL	30分						●		●
3	生理食塩液 50mL	FREE						●		●
1'	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V アロカリス点滴静注235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分	●							
2'	ゲムシタビン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL	30分	●							
3'	パラプラチン注射液 AUC5 生理食塩液 250mL	60分	●							
4'	生理食塩液 50mL	FREE	●							
内服	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後			●	●	●				

No.6

キイトルーダ200

※尿路上皮がん

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	1日目	22日目
1	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注 200mg 生理食塩液 100mL	30分	●		●
3	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●

No.7

キイトルーダ400

※尿路上皮がん

1コース(42日間)

順序	治療内容	投与時間	1日目	43日目
1	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注 400mg 生理食塩液 100mL	30分	●		●
3	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●

No.8

レンビマ+キイトルーダ200

※腎細胞がん

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	1日目	22日目
1	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注 200mg 生理食塩液 100mL	30分	●		●
3	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●
内服	レンビマ 1回20mg 1日1回 朝食後		● (初日は夕食後に内服)	●●●●●●● (連日内服)	● (初日は夕食後に内服)

初回は手足症候群予防としてヘパリン類似物質クリーム処方あり

★レンビマ減量：20mg→14mg→10mg→8mg→4mg

No.9

レンビマ+キイトルーダ400

※腎細胞がん

1コース(42日間)

順序	治療内容	投与時間	1日目	43日目
1	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注 400mg 生理食塩液 100mL	30分	●		●
3	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●
内服	レンビマ 1回20mg 1日1回 朝食後		● (初日は夕食後に内服)	●●●●●●● (連日内服)	● (初日は夕食後に内服)

□初回は手足症候群予防としてヘパリン類似物質クリーム処方あり

★レンビマ減量：20mg→14mg→10mg→8mg→4mg